



CUIDADOS DESPUÉS DE UNA BIOPSIA CON AGUJA GRUESA

1. Colóquese una bolsa de hielo (suministrada por nosotros) dentro del sostén, sobre el apósito, y retírela cuando el hielo se haya derretido. Use sostén durante 48 horas para ejercer presión sobre el apósito y mantenerlo en su lugar.
2. Retire el apósito dos días después de la biopsia. Puede lavarse el seno cuidadosamente, sin quitar la tira adhesiva SteriStrip. Tenga cuidado de que no se despegue.
3. Es posible que tenga molestias leves y que se formen moretones y un bulto en el lugar de la biopsia.
4. Si necesita algún medicamento para aliviar las molestias, tome Tylenol o extra strength Tylenol. **NO TOME ASPIRINA NI IBUPROFENO DURANTE 48 HORAS.**
5. Durante 24 horas después de la biopsia, no realice ninguna actividad que signifique esfuerzo, especialmente si tiene que usar el brazo del lado donde se realizó la biopsia.
6. Esté atenta a la presencia de sangrado excesivo, dolor, hinchazón o fiebre. Si se presenta alguno de estos síntomas, llame al Centro para el Cuidado de los Senos (Breast Cancer) o a su médico. Si esto le sucede después del horario de atención, vaya al sector de emergencias de Summit Medical Center. Le ofrecerán una receta de medicinas contra el dolor, para tomar después del procedimiento.
7. Un radiólogo la llamará al día siguiente para controlar cómo se siente.
8. Se hará todo lo posible por informarle acerca de los resultados de patología en el término de 48 horas, a menos que la biopsia se realice un viernes, en cuyo caso es posible que no lo resultados no estén hasta el lunes.

Gracias por darnos la oportunidad de servirlo.

Kathleen Colloton, RN, WHNP
(510) 869-6628